







Désignation: Cahours

Clos 4 Planche 1000té A Nº 6

Vigueur: 2

Date de mâturité: Les-9-1958 Rest

Charge:

s. 10

20

31

40

XMode

Désignation Cahours

Clos & Planche 10 côté # Nº 6

Vigueur : 2

Date de mâturité (: le 7-9-59)

Charge :

S. 1 8

2 6

3 13

4 4

Sailles

Désignation: Cahouro

Clos 4 Planche 10 Côté A Nº 6

Vigueur:

Date de mâturité: 2 9.61

Po 14.

S. 1 8

2 14

3 6

4 5

Désignation: Cahours

Clos (Planche le Rang A Souche C

Vigueur: 3 Vl. 13.867/

Date de Maturité: 17.962/

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G-M-P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

81 18 saveur: S-m-ar-fcx - herb.

S 2 17 Disc - sph - 611 - 0v
Obov - cyl - fus.

8 4 16 avec pépins - apyrène

8 5 0 jus: inc. - coloré

Calrours

1		Nombre	DATES							
1		! Total !	123	16.3	19-3	233			1	1
1	1	6.	.0.	.0.	! 2	1 3.	!		1	!
i	2	6.	.0.	.0.	.0.	1 ./ .	!			i
1	3	8.	.1.	1.1.	1.2.	.6.				
1	4	6.	. 1.	.3.	1.3.	.3.				! . ,
S. Saible	→5			! ! • •	! !		!			
		26		1	ſ) le 23-	3-59			•

eahours

San San

i	Nombre				D Å	T	E S			
!	total	30,3	5,4	10-4	1		1	1	1	
1 /1	1 13	.0.	.6.	10.+	1		. 1	 1 .	. !	
2 19	1 .14	. 0.	.8.*	12.+	!		. !	 ! .	. !	
3	16	.0.	.7.	! d !	!		. !	 1 .	. !	
1 4	12.	.0.	.5.	1 9 1			. !		. !	
1 5	1.5.	1.	1 .4 . x	1 .5 . k i	!				. !	

Désignation: Cahours

VASSAL el 4 Planche 10 Côté A Nº 6 Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 ouivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 4 .

 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5-57

Nº ordre

Cahaurs

Désignation:

VASSAL Uly Planche NO côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3) révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Pennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Calaus

VASSAL CLA Planche to coteA No 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Cahours

Désignation

VASSAL planche Wcôté A Nº 6 souche 12(3) 45.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite () - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 9 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (5)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - t'otalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3000

- angle rétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL Elq planche 10 côté A Nº 6 souche © 2 & 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Mogenne 5 - Compacte 🕥

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BALE

26 - Très grosse i ... Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très gruinée 7 - pruinée 🖲 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2

23 - Forme: discolde 0 - sphérolde! - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 6 - sutre 9,

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 📆

29 - 4 jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fire 5 - mogenne @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse O- molle 8.

30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - arcmatique 4 - foxée 5, herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte €- rougo 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte D- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident O- peu apparent 2.

32 - A pincoan a court 4 - toyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 59

Dénomination Planche côté Rang 4.10 A.6. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausser and 11/62

No d'ordre: Désignation: . Cahouns
No d'ordre : Designation:
Origine:
Emplacement: Cl.4. Vas. Pf.10. A.S. Vign
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: Forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.:
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4-5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Pennes 58 -

	.01
Nº d'ordre :	Désignation: . Cahaurs
Origine :	
Emplacement: H.MOA6. Vas	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - (2) - (3).
9 - L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	10-1-2-3
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6
	.0-1-2-3-4-5-6-7-82
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ · · · · · · · · · ·	
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Angel Rennes 63

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2008 grappgen 08

Observateur:

CodeIntro: 0Mtp171

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction: Cahours

Emplacement: Vass3R13s071-075

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Tae

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	13	(1/3 1/3)	15/3	18	
2	M	11(3 (4dib)	15/3	14	
3	1	1	1		
4	1				
5	13	M/3(hdeb)	15/3 Mdéb le 17/3	15	
Moyenne	37		15/3	47	13

+5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	29/5		25/07	7/7	3/09	

Grelles some compets 20/08

+ 5

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2008

Observateur: TD

Code cépage: 0Mtp171

Code introduction:

Nom introduction: Cahours

Emplacement: Vass3R13s071-075

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 15 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 22 plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7/- très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 12- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4- tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année: 2008

Code cépage:

Code introduction: 0Mtp171

Nom introduction: Cahours

Observateur:

Emplacement: Vass3R13s071-075

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 12- verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1- verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible D- moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence T- présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1 présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1 subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence: jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base: absence 1 - présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) **1** - faible (11-30%) **3** - moyen (31-50%) **5** - élevé (51-70%) **7** - très élevé (>80%) **9**.

Vassal .

Surface du rameau herbacé : unie / - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune 3

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert 4

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp171

Observateur:

	oduction: Cahours		Emplacen	ent · Vassa	R13s071-	075
THOM INC.	oddenon. Canouis	LIMBE	Linplacen	icit. V tibbe	11103071	075
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	Møyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	3-Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	1- Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	1- Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Yourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face sup. in	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	Absente				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	Nulle à t) fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	Nulle à f. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
		PETIOLE				
Oiv 090	Densité poils couchés	Nulle à t) fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle à tofb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
	SINUS PETIOLAIRE (égalemen	t observable sur		er, formulaire	n° 7)	
Oiv 079	Ouverture 1-très ouvert	2- ouvert	3- peu ouvert 2- en accolade	4- fermé 3- en V	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 81-1	Forme de la base	1- en U			uente de 1 ou :	2 1 4
	Dent sur le bord	Absence	2- riese 2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés	dente de 1 ou .	2 dents
Oiv 81-2	Base dégarnie	13 Absence			1	
Oiv 082	SINUS LATERAUX SUPERIEURS (ég Ouverture	1- absence de sinus	2-ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 83-1	Forme	1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent	1- Absence	2- Présence	fréquente		
	DENTS (également obser	vable sur feuille	s d'herbier, forn	nulaire nº 7)		
Oiv 076	Forme	1 côtés	2- côtés	3- notations	4- côtés	5- un côté
Oiv 077		Concaves	rectilignes Petites	2 + 4 Moyennes	convexes Grandes	concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	Courtes	Moyennes		Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes			Longues	Très longues
Oiv 501	AUTRE CARACTER		Faible		Élevé	Tuke (1 /
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	(11-30%)	Moyen (31-50%)	(51-70%)	Très élevé (>80%)

Formulaire de description 5/8

(stade maturité)

Année: 200 5 Observateur: Code cépage : 2 Code introduction: 0Mtp171 Nom introduction: Cahours Emplacement: Vass3R13s071-075 Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 15 a oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5)large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 12 oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule: très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue Valeur absolue (en mm.): 14 (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 14 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme D- uniforme 3. oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. \$ 5/09 9 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic: peu apparent 1,- apparent 2. oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteus 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. & oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 2 - présentes 2.

Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 - coloré 1. 000-18 région ombilicale : déprimée 1 - pon déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 - faible 3 moyen 5 - fort 7 - très fort 9.

Formulaire de description 6 / 8

(après chute des feuilles)

Année : 2008

GrapGene06

Observateur: T 5

Code cépage : 0

Code introduction: 0Mtp171

Nom introduction: Cahours Emplacement: Vass3R13s071-075

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes(1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 6 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 115~

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5-

Valeur absolue :

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

Nom du cépage : Cahours N° de code : Ottp 171

Poids de 100 pépins

2007. 3R13A71-75= -2008 - 11 = 3,199

Dimensions:

2007 - 3 R13 A 74-75 = 4 2008 = = 6,60-

Poids moyen d'1 baie:

2007 - 3 R13 2 71-75 - 3 02 g

2008: 1 = 2,51g

Dimensions:

Poids moyen d'1 grappe:

2007 : 3R 13 AM-75 = 2M g 2008 = " = 225 g 1994 = Lago = 537 g Mry=324 g

Dimensions: